




Самыми крупными приматами, которые населяют горные и дождевые леса Амазонии, являются ревуны. Большую часть времени эти широконосые обезьяны из семейства Паукообразные проводят на деревьях. Селятся ревуны по берегам рек, где живут довольно большими группами. Передвигаются медленными, неторопливыми шагами по деревьям, редко осуществляют прыжки. Хвост ревунов длинный и очень цепкий. Порой, эти обезьяны висят вниз головой, зацепившись хвостом за ветку дерева, и размахивают конечностями. Спят ревуны, лёжа или сидя на деревьях, накрутив на ветку свой цепкий хвост. На нижней поверхности хвоста имеются кожные гребешки, а кончик оголён.

Передние и задние лапы ревунов имеют приблизительно одинаковые размеры. Голова низко посажена. Лицо ревунов голое с сильно выступающими вперёд челюстями. Клыки большие и выделяются вперед. Тело ревунов несколько короче хвоста, достигает 90 сантиметров. Самцы крупнее самок.

Все ревуны способны издавать очень сильные крики, которыми они оповещают о занятости территории. Крики очень напоминают рык крупных хищников. Громкие звуки издаются за счёт своеобразного резонатора – сильно раздутой в костный пузырь подъязычной кости. Такие звуки слышатся на многие километры вперёд. Самым громким является рыжий ревунок, обитающий в Венесуэле.

У этого вида наиболее развита подъязычная камера и самый большой горловой мешок. У рыжих ревунов отсутствует половой диморфизм. Лицевые мышцы ревунов хорошо развиты и подвижны. Благодаря этому они умеют корчить гримасы и даже причмокивают языком во время еды. Пищевой рацион составляют плоды, листья и почки деревьев.

Забота о потомстве осуществляется, помимо родителей, всеми членами группы. Самки вынашивают детенышей в течение 5 месяцев. Плод один, реже два.

Ревуны крайне плохо приживаются в неволе, поэтому увидеть в зоопарке их практически невозможно. Размножение в неволе не происходит. В связи с этим большое значение имеют природоохранные мероприятия по сохранению этого вида в естественных условиях.

